

# ハチミツを与えるのは **1歳** を過ぎてから



## 赤ちゃんのお母さん・お父さんやお世話をする方へ

1. 1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって、乳児ボツリヌス症にかかることがあります。
2. ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。
3. ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。

## 食品事業者の方へ

ハチミツおよびハチミツを含む食品は「1歳未満の乳児には与えないで下さい。」という情報を、表示などにより消費者に分かりやすく提供できるようお願いします。

## 食中毒事例



### 《概要》


平成29年7月、広島県内の小学校の児童9名が気分不良及びおう吐の症状を訴え、救急車で病院へ搬送された。

調査の結果、前日に収穫したジャガイモを翌朝湯がき、喫食し、このうち9名が発症していた。

ジャガイモの残品から「ソラニン」が検出された。

《原因食品》 ジャガイモ

《病因物質》 ソラニン



一般にジャガイモの芽にソラニンが含まれています。

表面が青み（緑色）がかっているジャガイモはソラニンの濃度が高いこともあり、少量でも発症することがあります。

ソラニンは、ゆでても分解されません。

ジャガイモは直射日光の当たらない涼しい場所に保管しましょう！